



# ENFERMEDADES INFECCIOSAS

## EN ANIMALES DOMESTICOS

GUIA DE INFORMACION AL TUTOR



# RABIA

ESPECIE AFECTADA: 

Enfermedad causada por un virus que afecta al sistema nervioso central de los animales domésticos y salvajes. Está presente en todos los continentes menos en la Antártida y es de declaración obligatoria.



Es una enfermedad **zoonotica**. Se transmite al ser humano a través del **contacto** con la saliva infectada a través de mordeduras o arañazos.

## SIGNOS CLINICOS

- Haber recibido un mordisco días atrás.
- Cambios súbitos de comportamiento (irritable, agresivo).
- Agitación intensa que se alterna con depresión.
- Ladrido característico (alto y furioso), parálisis de músculos masticatorios (hidrofobia, incapacidad para comer, babeo).
- Parálisis progresiva que produce la muerte.



## RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN

- **Programas de vacunación** en animales de compañía, control y vacunación en animales comunitarios.
- **Evitar el contacto** con animales silvestres o desconocidos (zorros, murciélagos, mapaches o animales callejeros que actúen de manera extraña)
- **Lavar y desinfectar** inmediatamente cualquier mordedura.
- **Dirigirse al Centro Veterinario** mas cercano si observa los signos clinicos.



# DISTEMPER CANINO

ESPECIE AFECTADA: 

El distemper canino, también llamado **Moquillo** o **Enfermedad de Carré**. Es una enfermedad muy contagiosa, cuya gravedad depende en gran parte de la respuesta inmunitaria del hospedador.

El virus se transmite a través de las **secreciones** del aparato respiratorio, digestivo y también en la orina.



Los cachorros **no vacunados de 3 - 6 meses de edad** son los que están más predispuestos a la infección, ya que disminuye la inmunidad materna.

## SIGNOS CLINICOS

### Forma aguda`

- Sintomatología general (fiebre).`
- Oculonasales: moco, conjuntivitis, queratitis.`
- Dérmicos: hiperqueratosis (trufa y almohadillas plantares).
- Respiratorios: tos, ruidos respiratorios y disnea.

- Digestivos: diarrea, vómitos aislados, deshidratación y anorexia.
- Nerviosos: rigidez cervical, ataxia, convulsiones, paresia.

### Forma crónica

- Signos nerviosos progresivos.



## RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN

- **No existe un tratamiento** específico, se dirige a paliar los síntomas.
- Lo más indicado es **prevenir** el contagio mediante **vacunación**.



# PARVOVIRUS CANINO

ESPECIE AFECTADA: 

Enfermedad producida por un Parvovirus. Es la causa más frecuente de **enteritis vírica en cachorros (6 semanas - 6 meses)**. Es más grave en cachorros con crecimiento rápido.

El virus se transmite principalmente por **vía fecal-oral**, por exposición de animales vulnerables a heces contaminadas.



El parvovirus es **resistente en el ambiente durante meses**. Se inactiva con hipoclorito sódico.

## SIGNOS CLINICOS

### Forma entérica

- Fiebre, vómitos y diarreas: deshidratación.
- Septicemia, shock hipovolémico o séptico.
- Muerte asociada a procesos graves de deshidratación.

### Razas Más Sensibles

- Rottweiler.
- Doberman.
- Labrador Retriever.
- Pitbull Terrier Americano.
- Pastor Alemán.
- Yorkshire Terrier



### RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN

- **No existe un tratamiento** específico, se dirige a paliar los síntomas.
- Lo más indicado es **prevenir** el contagio mediante **vacunación**.



# HEPATITIS INF. CANINA

ESPECIE AFECTADA: 

Enfermedad sistémica producida por el **adenovirus canino tipo 1**.

El virus ingresa por **vía oronasal**. Los animales infectados eliminan virus a través de saliva, orina y heces entre 10-15 días posinfección.

## SIGNOS CLINICOS

- Fiebre
- Anorexia
- Letargia
- Vómitos
- Diarrea.
- Uveítis.
- Hepatitis (aguda o leve)
- Hepatomegalia.
- Linfadenopatía.
- Edema subcutáneo.
- Hemorragias
- Signos nerviosos.



## RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN

- **No existe un tratamiento** específico, se dirige a paliar los síntomas.
- Lo más indicado es **prevenir** el contagio mediante **vacunación**.

